

Grandes
Cultures

vertissements® agricoles uvergne

Bulletin technique N° 7 du 12/07/94

MAIS
Pyrale : Traitement urgent.
BETTERAVES
Cercosporiose : Vigilance.

MAIS

PYRALE

★ Situation

- En cage d'élevage à MARMILHAT (63) :

Vol très actif fin Juin à début Juillet avec un début de diminution depuis le 6/07.

- Aux piégeages sexuels :

Captures en tous secteurs et plus soutenues début Juillet.

- Pontes : Peu de pontes fraîches actuellement.

★ Préconisation

Confirmation de limite des traitements au 13 Juillet.

PUCERONS

★ Situation

Les populations sont faibles.

★ Préconisation

Une surveillance s'impose courant Juillet (notamment les parcelles ayant reçu une protection pyrale avec un pyrèthrinoïde liquide).



Le principal puceron nuisible à ce stade du maïs est le *Rhopalosiphum padi*. Ce puceron est identifiable par sa couleur vert clair à noir avec la base de l'abdomen couleur lie de vin.

SEUIL D'INTERVENTION : 1 Panicule colonisée sur 2.

BETTERAVES

MALADIES

★ Situation

Les premières taches de Cercosporiose sont observées dans les secteurs de MOISSAT - LEMPTY (63), mais la situation sanitaire est bonne dans la majorité des parcelles de la zone betteravière à ce jour.

★ Préconisation

Une vigilance s'impose, vigilance d'autant plus grande en cas d'arrivée d'une période pluvio-orageuse.

Il est important de signaler la nécessité d'alterner ou d'associer deux familles chimiques différentes dans la stratégie de protection fongique. Ainsi, pour ce premier traitement, il serait judicieux d'utiliser une matière active à action plus préventive vis-à-vis de la Cercosporiose comme les sels d'étain (Fentine hydroxyde et Fentine acétate).

Consulter la fiche "Maladies foliaires de la Betterave" - Les produits de traitement...qui vous a été transmise avec notre bulletin N° 6 du 16/06/94.

Conserver précieusement la fiche phytosanitaire couleur "Principales Maladies de la Betterave".